

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Prevendog 1,056 g gyógyszeres nyakörv kis- és közepes testű kutyák részére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Gran Via Carles III, 98, 7^a

08028 - Barcelona

Spanyolország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

AB7 SANTE

Chemin des Monges

31450 Deyme

Franciaország

Helyi képviselő:

VIRBAC HUNGARY KFT

Dózsa György út 84. B épület

HU-1068 Budapest

Tel.: +36703387177

akos.csoman@virbac.hu

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Prevendog 1,056 g gyógyszeres nyakörv kis- és közepes testű kutyák részére A.U.V.

Deltametrin

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy 60 cm-es (26,40 g) nyakörv tartalmaz:

Hatóanyag:

Deltametrin	1,056 g
-------------	---------

Segédanyagok:

Titánium-dioxid (E171):	0,376 g
-------------------------	---------

Szén, aktivált	0,020 g
----------------	---------

Szürke színű gyógyszeres nyakörv.

4. JAVALLAT(OK)

Deltametrinre érzékeny parazitafertőzés esetén.

Megelőzi a kullancsokkal (*Ixodes ricinus* és *Rhipicephalus sanguineus*) való újra fertőződést 6 hónapig tartó ölő hatása által.

Megelőzi a vérszívó lepkeszúnyogok (*Phlebotomus perniciosus*) csípését, a repellens (táplálkozás ellenes) hatás 12 hónapig tart.

Megelőzi a csípőszúnyogok (*Culex pipiens*) csípését, a repellens (táplálkozás ellenes) hatás 6 hónapig tart.

5. ELLENJAVALLATOK

Vizsgálatok hiányában 7 hetesnél fiatalabb kutyakölykökön nem alkalmazható.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Nem alkalmazható macskákon.

Nem alkalmazható, ha a kutyán bőrsérülés van.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ritka esetben a nyakon, vagy az egész testfelületen helyi bőrreakciók (viszketegség, bőrpír, szőr hullás) jelentkezhetnek, melyek helyi vagy általános túlérzékenységi reakciót jelezhetnek.

A bőrelváltozásokhoz gyakran társul megváltozott viselkedést (pl. levertség vagy hiperaktivitás) ritka esetekben szintén jelentettek.

Nagyon ritkán emésztőszervi tüneteket, mint például hányást, hasmenést és nyálzást figyeltek meg.

Nagyon ritkán idegrendszeri tüneteket, mint például ataxiát és izomremegést tapasztaltak.

A tünetek a nyakörv levételét követő 48 órán belül rendszerint elmúlnak.

A fenti tünetek bármelyikének jelentkezésekor a nyakörvet le kell venni az állatról. Mivel specifikus antidótum nem ismert, tüneti kezelést kell alkalmazni.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik)
- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb, mint 10-nél jelentkezik)
- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb, mint 10-nél jelentkezik)
- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb, mint 10-nél jelentkezik)
- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb, mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is).

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)


Kutya (0 - 25 kg) kis- és közepes testű

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Egy kutyára egy nyakörvet kell helyezni. A 60 cm-es nyakörv kis- és közepes testű kutyákra javasolt, 48 cm-es nyak méretig.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A nyakörvet, ki kell venni a csomagolásból majd a védő szalagot el kell távolítani. A nyakörvet lazán a nyak köré kell illeszteni: megfelelő felhelyezésnél az állat nyaka és a nyakörv között két egymás mellé zárt ujjnak el kell férnie. A nyakörv végét át kell csúsztatni a csaton keresztül és az 5 cm-nél hosszabb szabadon álló részt le kell vágni.



A nyakörv biztonsági mechanizmussal (fojtás elleni) rendelkezik. Abban a valószínűtlen esetben, ha a kutya fennakadna, a saját ereje elegendő a nyakörv meglazítására, ezáltal biztosítva a gyors kiszabadulást.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

A tasak az eredeti kartondobozban tárolandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén és a dobozon EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A nyakörv teljes hatékonyságát a felhelyezés után egy héttel éri el, ezért, ha az állatok fertőzött helyre kerülnek, akkor a nyakörvet ezt megelőzően egy héttel kell felhelyezni.

A kullancsok 24-48 órával a kezelt állatra kerülés után elpusztulnak és leesnek a gazdaállatról általában vérszívás nélkül, de egy-egy kullancs megtapadását a kezelt állaton nem lehet kizárni. Ezért a kullancsok által közvetített betegségek átadását nem lehet kizárni. Kedvezőtlen körülmények között a kullancsok és lepkeszúnyogok által közvetített fertőző betegségek átadását nem lehet kizárni.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Samponos fürdetésnek a készítmény hatékonyságára gyakorolt hatását nem vizsgálták.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A készítmény véletlen lenyelése nemkívánatos reakciókat, többek között neurotoxikus hatásokat okozhat.

A készítményt az eredeti csomagolásában tartandó. A nyakörv felhasználásig a tasakban tartandó.

Tilos enni, inni és dohányozni a nyakörv felhelyezése közben. A nyakörv ételtől, italtól és állati takarmányoktól távol tartandó.

Nem szabad engedni, hogy a nyakörvvel gyerekek játszanak, vagy a szájukba vegyék. A nyakörv maradékát vagy a levágott darabot azonnal ki kell dobni. A nyakörv felhelyezése után hideg vízzel kezet kell mosni.

El kell kerülni a nyakörvvel vagy a nyakörvet viselő kutyával történő hosszas érintkezést. Ennek megfelelően a nyakörvet viselő állattal nem szabad egy ágyban aludni; ez különösen gyermekek esetében fontos. Véletlen szájon át történő felvétel vagy lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

A deltametrin iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati készítménnyel és a kezelt állatokkal való érintkezést. Hiperszenzitivitási tünetek jelentkezésekor orvoshoz kell fordulni.

További különleges óvintézkedések

Bár a vízzel való esetenkénti érintkezés nem csökkenti a nyakörv hatékonyságát, a deltametrin mérgező a halakra és más vízi élőlényekre. A nyakörvet viselő kutya nem úsztatható természetes vizekben.

Vemhesség és laktáció:

Patkányokon és nyulakon végzett laboratóriumi vizsgálatok szerint a készítmény nem rendelkezik bizonyított teratogén hatással. Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség idején. Alkalmazása vemhesség alatt nem javasolt. Laktáció ideje alatt alkalmazható.

Gyógyszerkölesönhatások és egyéb interakciók:

Más piretroidokkal vagy organofoszfátokkal együtt nem alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

Ha a kutya véletlenül megenné a nyakörvet, a következő mérgezési tünetek jelentkezhetnek: koordinálatlan mozgás, remegés, nyálzás, hányás, a hátsó végtagok merevsége. Ezek a tünetek rendszerint 48 órán belül elmúlnak. Véletlen lenyelés esetén az állat tulajdonosa vegye fel a kapcsolatot a kezelő állatorvossal és ne kezdjen tüneti kezelésbe, mert a kezelő állatorvos értékeli a tüneteket és határozza meg a szükséges kezelést.

Inkompatibilitások:

Nem értelmezhető.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2025. október 3.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kiszерelés:

Kartondobozban, vagy fém dobozban, egy tasakban, 1 60 cm-es nyakörv.

Kartondobozban, vagy fém dobozban, kettő tasakban, 1 60 cm-es nyakörv.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszérelés kerül kereskedelmi forgalomba.